

Im Falle eines Darmverschlusses nicht einnehmen

Juniorlax[®] elektrolytfrei



Dosierbeutel

MEDIZINPRODUKT CE0426

Hilft bei Verstopfung

1. Kennzeichnung, Zusammensetzung und Zweck des Medizinprodukts

Juniorlax[®] elektrolytfrei ist ein Abführmittel, das die Darmtätigkeit osmotisch auf natürliche Weise reguliert. Es wird nicht absorbiert, fermentiert nicht im Darm, führt zu keiner Reizung der Schleimhäute und wird mit dem Stuhl ausgeschieden. Juniorlax[®] elektrolytfrei ist besonders bei chronischer Verstopfung sowie bei gelegentlich unregelmäßiger Darmtätigkeit angezeigt. Wegen seiner Wasseraffinität macht Juniorlax[®] elektrolytfrei den Stuhl weich und erleichtert so das Abführen ohne Krämpfe, Unterleibsschmerzen oder Notfallsituationen. Die Wirksamkeit wird im Laufe der Zeit nicht herabgesetzt.

1.1 Bestandteile

Jeder Dosierbeutel enthält 6,563 g Macrogol 3350.

Sonstige Bestandteile:

Siliziumdioxid, Geschmacksstoffe, Natriumsaccharin.

2. Packungsgröße

Juniorlax[®] elektrolytfrei ist als lösliches Pulver zur oralen Einnahme erhältlich. Eine Packung enthält 30 Dosierbeutel zur einmaligen Anwendung.

3. Dosierung und Art der Anwendung

Kinder von 6 Monaten bis 2 Jahren (bis 12 kg):

1-2 Dosierbeutel (à 6,5 g) pro Tag

Kinder von 2 bis 11 Jahren (12 bis 20 kg):

2-3 Dosierbeutel (à 6,5 g) pro Tag

Kinder über 11 Jahre (oder schwerer als 20 kg):

2-5 Dosierbeutel (à 6,5 g) pro Tag

Inhalt eines Dosierbeutels in 62,5 ml (etwa ein halbes Glas) stilles Wasser geben und auflösen.

Die Tagesdosis kann auch in mehrere Einnahmen unterteilt werden. Die Dosis kann je nach Reaktion der betroffenen Person erhöht oder gesenkt werden. Es ist in jedem Fall ein Arzt aufzusuchen. Vor der Verwendung bei Kindern ist unbedingt ein Arzt zurate zu ziehen. Im Normalfall beträgt die tägliche Maximaldosis 5 Dosierbeutel.

4. Gegenanzeigen

Juniorlax[®] elektrolytfrei bei folgenden Erkrankungen nicht einnehmen:

- Darmstenose
- Darmperforation
- Entzündliche Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

Im Falle eines Darmverschlusses nicht einnehmen

Es liegen keine Erfahrungsberichte zur Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Juniorlax[®] elektrolytfrei daher ausschließlich bei Bedarf auf ärztliche Anweisung einnehmen.

Die Dosierung muss im Falle von Nierenbeschwerden nicht angepasst werden. Eine Behandlung mit Juniorlax[®] elektrolytfrei sollte maximal 2 Wochen dauern. Die Behandlung kann im Bedarfsfall wiederholt werden. Im Falle einer hartnäckigen oder chronischen Verstopfung kann eine längere Einnahmedauer erforderlich sein. Eine solche Verstopfung kann durch Medikamente, Schmerzmittel (Opiate), bei der Behandlung von Parkinson (Anticholinergika) hervorgerufen werden oder im Zusammenhang mit multipler Sklerose, Parkinson und anderen Erkrankungen auftreten.

5. Nebenwirkungen

Nebenwirkungen wurden für therapiewirksame Dosierungen bisher nicht berichtet.

Gelegentlich wurden Störungen des Magen-Darmtrakts, Borborygmen, Unterleibsschmerzen, Übelkeit und leichter Durchfall (besonders zu Beginn der Behandlung) beobachtet. In seltenen Fällen können Überempfindlichkeiten (Ausschlag und Nesselfieber) auftreten.

Wenden Sie sich bei diesen und anderen Nebenwirkungen umgehend an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenden Sie sich bei hartnäckigen Symptomen an Ihren Arzt.

Haben Sie die Einnahme vergessen, setzen Sie die Einnahme zum nächsten Zeitpunkt normal (also nicht mit der doppelten Menge) fort.

6. Wechselwirkungen

Aktuell liegen keine Hinweise auf Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vor. Allgemein sollte das Produkt jedoch frühestens 2 Stunden nach der oralen Einnahme oder sonstigen Verabreichung anderer Arzneimittel (einschließlich homöopathischer Mittel) oder Nahrungsergänzungstoffe eingenommen werden, da deren Wirkung durch die osmotische Wirkung von Macrogol und den dadurch beschleunigten Darmdurchgang herabgesetzt werden kann.

Wenden Sie sich bei parallel verfolgten Therapien unbedingt an Ihren Arzt.

7. Aufbewahrung

Juniorlax® elektrolytfrei trocken und ohne direkte Wärme- oder Lichteinstrahlung aufbewahren: Dosierbeutel nur bei Bedarf öffnen. Beschädigte Dosierbeutel nicht verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Medizinprodukt bei unter 25 °C aufbewahren.

8. Warnungen und Sicherheitshinweise

Suspension erst direkt vor der oralen Einnahme herstellen.

Produkt bei Kindern unter 6 Monaten nicht anwenden.

Die angegebenen Dosierungen sollten nicht überschritten werden, da sonst unerwartete Nebenwirkungen auftreten können.

Juniorlax® elektrolytfrei während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen.

Während der Behandlung mit Juniorlax® elektrolytfrei sollte eine geeignete Diät beachtet und zur Vorbeugung gegen eine Dehydrierung in Rücksprache mit dem Arzt eine orale Rehydratationslösung (ORL) eingenommen werden.

Die maximal ununterbrochene Anwendungsdauer beträgt 30 Tage. Wenden Sie sich bei hartnäckigen Symptomen an Ihren Arzt.

Im Falle einer Unverträglichkeit nicht einnehmen. Nicht einnehmen bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe und Polyäthylenglykol.

Die Dosierbeutel sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und sollten erst zum Anwendungszeitpunkt geöffnet werden.

9. Verfallsdatum

Produkt nach Erreichen des auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum gilt für ein einwandfreies Produkt in seiner unbeschädigten Originalverpackung.

10. Entsorgung

Das abgelaufene Produkt ist gemäß den Abfallbehandlungsvorschriften der lokalen Einrichtungsleitung zu entsorgen.

Das Produkt oder die Verpackung nicht in die Umwelt gelangen lassen.



SIIT srl, Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI),
Italien



Vertrieb Deutschland:

Ardeypharm GmbH Pharmazeutische Fabrik
Loerfeldstraße 20, 58313 Herdecke

Stand der Information: 01/2020